



コバトン



彩の国
埼玉県

フェロモントラップ等調査データ（イネカメムシ）

令和 8 年 7 月 2 7 日
埼玉県病虫害防除所

1 調査期間

令和 8 年 6 月～令和 8 年 9 月

2 調査地点

（1）白熱電球予察灯（水稻各種害虫調査用）


春日部市樋籠、加須市大越、熊谷市玉井（玉井試験場）、
川越市南田島、本庄市児玉町吉田林、川島町上八ツ林

（2）水銀灯予察灯（果樹カメムシ類調査用）

春日部市内牧、久喜市六万部（久喜試験場）、上里町長浜

3 データ



（1）白熱電球予察灯（準平年値は、各地で本虫の誘殺が始まった R3～R7 の 5 年間）




5日間移動平均値データ

6～9月(第1半旬～第6半旬／月)

※春日部市は R2 から誘殺が始まったが、R3 は未調査のため R2, R4, R5, R6, R7 の 5 年間




イネカメムシ誘殺消長
(対象作物:水稲 調査地点:川越市南田島)



5日間移動平均値データ


6～9月(第1半旬～第6半旬/月)

イネカメムシ誘殺消長
(対象作物:水稲 調査地点:本庄市児玉町吉田林)



5日間移動平均値データ

6～9月(第1半旬～第6半旬/月)



(2) 水銀灯予察灯 (令和6年から調査)

