

(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)

※ 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の申請に用いる臨床調査個人票でも可とする。

ふりがな			性別		生年月日		
氏名							
住所	郵便番号			電話 ()	出生都道府県	発病時在住都道府県	
発病年月	初診年月日				保険種別		
身体障害者手帳	1. あり (等級 _____ 級) 2. なし		介護認定	1. 要介護 (要介護度 _____) 2. 要支援 3. なし			
生活状況	社会活動 (1. 就労 2. 就学 3. 家事労働 4. 在宅療養 5. 入院 6. 入所 7. その他 (_____))					初回認定年月	
	日常生活 (1. 正常 2. やや不自由であるが独力で可能 3. 制限があり部分介助 4. 全面介助)						
受診状況 (最近1年)	1. 主に入院 2. 入院と通院半々 3. 主に通院 (_____ /月) 4. 往診あり 5. 入通院なし 6. その他 (_____)						

治療と経過 (前回申請からの変化を中心に具体的に記述)

家族内発症	1. あり 2. なし 3. 不明	ありの場合: 父・母・兄・姉・弟・妹・祖父・祖母 (父方・母方)・他 (_____) (プリオン病・認知症・その他 (_____))
-------	-------------------	--

臨床症候	1 経過 経過の進行性	1. あり 2. なし 3. 不明 (_____)
	2 症候 初発症状 (_____)	
	(1) ミオクローヌス	1. あり (_____ 年 _____ 月から) 2. なし 3. 不明
	(2) 進行性認知症、又は意識障害	1. あり (_____ 年 _____ 月から) 2. なし 3. 不明
	(3) 錐体路症候	1. あり (_____ 年 _____ 月から) 2. なし 3. 不明
	(4) 錐体外路症候	1. あり (_____ 年 _____ 月から) 2. なし 3. 不明
	(5) 小脳症状 (ふらつき)	1. あり (_____ 年 _____ 月から) 2. なし 3. 不明
	(6) 視覚異常	1. あり (_____ 年 _____ 月から) 2. なし 3. 不明
	(7) 精神症候	1. あり (_____ 年 _____ 月から) 2. なし 3. 不明
	(8) 無動・無言状態	1. あり (_____ 年 _____ 月から) 2. なし 3. 不明
(9) その他症候 (_____)	1. あり (_____ 年 _____ 月から) 2. なし 3. 不明	
(10) (_____)	1. あり (_____ 年 _____ 月から) 2. なし 3. 不明	

検査所見	(1) 脳波: PSD	1. あり 2. なし 3. 不明	(検査時期 _____ 年 _____ 月 _____ 日)
	基礎律動の徐波化	1. あり 2. なし 3. 不明	(検査時期 _____ 年 _____ 月 _____ 日)
	(2) 画像: CT、MRIで脳萎縮	1. あり 2. なし 3. 不明	(検査時期 _____ 年 _____ 月 _____ 日)
	diffusion 又はFLAIRで高信号	1. あり 2. なし 3. 不明	(検査時期 _____ 年 _____ 月 _____ 日)
	(3) プリオン蛋白 (PrP) 遺伝子検査	1. 施行 2. 未施行	(検査時期 _____ 年 _____ 月 _____ 日)
	変異 (1. あり 2. なし 3. 不明) 内容 (_____)		
	コドン129の多型: Met/Met Met/Val Val/Val	コドン219の多型: Glu/Glu Glu/Lys Lys/Lys	
	(4) 脳脊髄液 (検査時期 _____ 年 _____ 月 _____ 日)	細胞数 (1. 正 2. 増 (_____ / μ l))	
蛋白量 (1. 正 2. 増 (_____ mg/dl、基準値 _____))	総タウ蛋白 (1. 正 2. 増 (_____ pg/ml、基準値 _____))		
NSE (1. 正 2. 増 (_____ ng/dl、基準値 _____))	14-3-3蛋白 (1. 正 2. 増 _____)		

【プリオン病 認定基準】

プリオン病の分類

プリオン病はその発症機序から、1. 原因不明の孤発性、2. プリオン蛋白遺伝子変異による遺伝性、3. 異常プリオン蛋白の伝播による獲得性、の3つに大きく分類される。

1. 孤発性プリオン病

CJDの診断基準

1. 確実例 (definite) : 脳組織においてCJDに特徴的な病理所見を証明するか、またはウェスタンブロット法か免疫組織学的検査にて異常プリオン蛋白が検出されたもの。
2. ほぼ確実例 (probable) : 病理所見・異常プリオン蛋白の証明は得られていないが、進行性認知症を示し、さらに脳波上の周期性同期性放電を認める。さらに、ミオクローヌス、錐体路または錐体外路徴候、小脳症状（ふらつき歩行を含む）または視覚異常、無動無言状態のうち2項目以上を呈するもの。あるいは、「3. 疑い例」に該当する例で、髄液14-3-3 蛋白陽性で全臨床経過が2年未満であるもの。
3. 疑い例 (possible) : ほぼ確実例と同様の臨床症状を呈するが、脳波上の周期性同期性放電を認めないもの。

2. 遺伝性プリオン病

(a) プリオン蛋白遺伝子変異V180Iによる家族性CJD

画像所見や臨床症状から V180I を疑った場合の診断に最も重要なのはプリオン蛋白遺伝子の検索である。

(b) プリオン蛋白遺伝子変異P102LによるGSS (GSS102)

GSSの診断基準

1. 確実例 (definite) : 進行性認知症、小脳症状、痙性対麻痺などを呈する。プリオン蛋白遺伝子の変異が認められ、脳組織においてGSSに特徴的な病理所見を証明するか、またはウェスタンブロット法か免疫組織学的検査にて異常プリオン蛋白が検出されたもの。
2. ほぼ確実例 (probable) : 臨床症状とプリオン蛋白遺伝子の変異は確実例と同じであるが、病理所見・異常プリオン蛋白の証明が得られていないもの。
3. 疑い例 (possible) : 家族歴があり、進行性認知症を呈し、小脳症状か痙性対麻痺を伴うが、プリオン蛋白遺伝子の変異や病理所見・異常プリオン蛋白の証明が得られていないもの。

(c) プリオン蛋白遺伝子変異E200Kによる家族性CJD

孤発性との鑑別にはプリオン蛋白遺伝子の検索が必要である。

(d) 致死性家族性不眠症 (FFI)

FFIの診断基準

1. 確実例 (definite) : 臨床的に進行性不眠、認知症、交感神経興奮状態、ミオクローヌス、小脳失調、錐体路徴候、無動無言状態などFFIとして矛盾しない症状を呈し、プリオン蛋白遺伝子のコドン178の変異を有しコドン129がMet/Metである。さらに脳組織においてFFIに特徴的な病理所見を証明するか、またはウェスタンブロット法か免疫組織学的検査にて異常プリオン蛋白が検出されたもの。

2. ほぼ確実例 (probable) : 臨床的にFFIとして矛盾しない症状を呈し、プリオン 蛋白遺伝子のコドン178の変異を有しコドン129がMet/Metであるが、病理所見・異常プリオン蛋白の証明が得られていないもの。
3. 疑い例 (possible) : 臨床的にFFIとして矛盾しない症状を呈しているが、プリオン蛋白遺伝子変異や病理所見・異常プリオン蛋白の証明が得られていないもの。

(e) その他の遺伝性プリオン病

わが国に多い病型としては M232R 変異による家族性 CJD があげられる。M232R は V180I と類似しており、我が国でのみ報告されていて家族内発症が確認された報告はなく、診断にはプリオン病遺伝子検索が必須である。平均発症年齢が 66.6 歳、平均罹病期間は 1.3 年であり、古典型孤発性 CJD と同様の臨床経過、検査所見を呈する例が大半である。その他、多数の家族性 CJD を来す遺伝子変異が知られているが希である。

また、GSS にも P102L の他に痙性対麻痺を呈する P105L 変異などが知られている。

3. 獲得性プリオン病

(a) ヒト由来乾燥硬膜移植による CJD

診断基準

医原性 CJD の診断基準は孤発性 CJD のものに準じる。

(b) 変異型クロイツフェルト・ヤコブ病 (variant Creutzfeldt-Jakob disease : vCJD)

変異型クロイツフェルト・ヤコブ病の診断基準

I

- A. 進行性精神・神経障害
- B. 経過が6か月以上
- C. 一般検査上、他の疾患が除外できる。
- D. 医原性の可能性がない。
- E. 家族性プリオン病を否定できる。

II

- A. 発症初期の精神症状 (a)
- B. 遷延性の痛みを伴う感覚障害 (b)
- C. 失調
- D. ミオクローヌスか、舞踏運動か、ジストニア
- E. 認知症

III

- A. 脳波で PSD 陰性 (c) (または脳波が未施行)
- B. MRIで両側対称性の視床枕の高信号 (d)

IV

- A. 口蓋扁桃生検で異常プリオン陽性 (e)

確 実 例 : I A と神経病理で確認したもの (f)

ほ ぼ 確 実 例 : I + II の 4/5 項目 + IIIA + IIIB または I + IVA

疑 い 例 : I + II の 4/5 項目 + IIIA

a : 抑鬱、不安、無関心、自閉、錯乱

b : はっきりとした痛みや異常感覚

c : 約半数で全般性三相性周期性複合波

d : 大脳灰白質や深部灰白質と比較した場合

e : 口蓋扁桃生検をルーチンに施行したり、孤発性 CJD に典型的な脳波所見を認める例に施行することは推奨されないが、臨床症状は矛盾しないが視床枕に高信号を認めない vCJD 疑い例には有用である。

f : 大脳と小脳の全体にわたって海綿状変化と広範なプリオン蛋白陽性の花卉状クールー斑