

がい よう ばん  
**概要版**

詳しく知りたい方向けの詳細版もあります。

**小学校6年** ~ **高校1年<sup>相当</sup>** の女の子と  
保護者の方へ大切なお知らせ



**HPVワクチンについて知ってください**  
～あなたと関係のある“がん”があります～

# ウイルス感染でおこる子宮けいがん

詳細版  
P2~3

「がんってたばこでなるんでしょ？」

「オトナがなるものだから私は関係ない」って思っていないですか？

実はウイルスの感染がきっかけでおこる“がん”もあります。その1つに子宮けいがんがあります。

HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因と考えられています。

このウイルスは、女性の多くが“一生に一度は感染する”といわれるウイルスです\*。

感染しても、ほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、

一部の人でがんになってしまうことがあります。

現在、感染した後にはどのような人ががんになるのかわかっていないため、

感染を防ぐことががんにならないための手段です。

\*HPVは一度でも性的接触<sup>せっしょく</sup>の経験があればだれでも感染する可能性があります。



女性の多くがHPV(ヒトパピローマウイルス)に  
“一生に一度は感染する”といわれる

がんになる場合も

感染を防ぐことが  
がんにならないための手段


## <何人くらいが子宮けいがんになるの？>

日本では毎年、約1.1万人の女性が子宮けいがんになり、毎年、約2,900人の女性が亡くなっています。  
患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療<sup>ちりょう</sup>で子宮を失ってしまう(妊娠<sup>にんしん</sup>できなくなってしまう)人も、1年間に約1,000人います。

## <一生のうち子宮けいがんになる人>

1万人あたり132人

2クラスに1人くらい




1クラス約35人の女子クラスとして換算<sup>かんさん</sup>

## <子宮けいがんて亡くなる人>

1万人あたり34人

10クラスに1人くらい



## 子宮けいがん<sup>けい</sup>で苦しまないために、できることが2つあります

詳細版  
P4

### ① 今からできること

日本では、小学校6年～高校1年相当の女の子を対象に、子宮けいがんの原因となるHPVの感染を防ぐ

ワクチンの接種を提供しています。

HPVの感染を防ぐことで、

将来の子宮けいがんを予防できると

期待されています。

カナダ、イギリス、オーストラリアなどでは女の子の約8割がワクチンを受けています。



### ② 20歳<sup>さい</sup>になったらできること

HPVワクチンを受けていても、子宮けいがん<sup>けんしん</sup>検診は必要です。

2年に1度

検診を受けることが

大切です。



## HPVワクチンの効果

詳細版  
P5

HPVの中には子宮けいがんをおこしやすい種類のものがあります。

HPVワクチンは、このうち一部の感染を防ぐことができます。

そのことにより、子宮けいがんの原因の50～70%を防ぎます※。

また、HPVワクチンで、がんになる手前の状態(前がん病変)が減るとともに、がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。

※ワクチンで防げる種類のHPVが、子宮けいがんの原因の50～70%を占めます。



## HPVワクチンのリスク

詳細版  
P6

多くの方に、接種を受けた部分の痛みや腫れ、赤みなどの症状<sup>しょうじょう</sup>が起こることがあります。

筋肉注射という方法の注射で、インフルエンザの予防接種等と比べて、痛みが強いと感じる方もいます。

ワクチンの接種を受けた後に、まれですが、重い症状<sup>じゆうじょう</sup>※1が起こることがあります。

また、広い範囲<sup>はんい</sup>の痛み、手足の動かしにくさ、不随意運動<sup>ふずいいうんどう</sup>※2といった多様な症状が報告されています。

ワクチンが原因となったものかどうかわからないものをふくめて、

接種後に重篤<sup>じゆうとく</sup>な症状<sup>じゆうとく</sup>※3として報告があったのは、ワクチンを受けた1万人あたり約6人です。

ワクチンを合計3回接種しますが、1回目、2回目に気になる症状が現れたら、

それ以降の接種をやめることができます。

接種後に気になる症状が出たときは、まずはお医者さんや周りの大人に相談してください※4。


※1 重いアレルギー症状(呼吸困難やじんましんなど)や神経系の症状(手足の力が入りにくい、頭痛・嘔吐・意識の低下)

※2 動かそうと思っていないのに体の一部勝手に動いてしまうこと

※3 重篤な症状には、入院相当以上の症状などがふくまれています。

報告した医師や企業の判断によるため、必ずしも重篤でないものも重篤として報告されることがあります。

※4 HPVワクチン接種後に生じた症状の診療を行う協力医療機関をお住まいの都道府県ごとに設置しています。



## HPVワクチンについて知ってください

すべてのワクチンの接種には、効果とリスクとがあります。  
 まずは、子宮けいがんとHPVワクチン、子宮けいがん<sup>けんしん</sup>検診について知ってください。  
 周りの人とお話ししてみたり、かかりつけ医などに相談することもできます。



## HPVワクチンを受けることを希望する場合は

詳細版  
P5.8

小学校6年～高校1年相当の女の子は、  
 2種類のHPVワクチンを公費で受けられます\*。  
 病院や診療所<sup>しん りょう じょ</sup>で相談し、どちらか一方を接種します。  
 ワクチンの種類によって接種の間隔<sup>かんかく</sup>が少し異なりますが、  
 どちらも半年～1年の間に3回接種を受けます。接種には、保護者の方の同意が必要です。  
 ※公費の補助がない場合の接種費用は、3回接種で約4～5万円です。

対象年齢の  
女の子は公費

半年～1年の間に  
3回接種

### 市町村からのご案内 <記載例>

- ① 接種場所  
市内の契約医療機関 (〇〇市ホームページ <http://www.xxxxxxxx.lg.jp>)
- ② 接種費用  
〇〇円
- ③ 接種に必要なもの
  - ① 市民であることを確認できるもの (健康保険証など)
  - ② 予約票 (契約医療機関又は市町村に備え付けています)
 ※保護者の署名が必要です
- ④ お問い合わせ先  
〇〇市保健福祉部保健予防課 電話 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 (午前〇時～〇時)

## HPVワクチンについて、もっと詳しく知りたい方は

このご案内の内容をもっと詳しく説明している「HPVワクチンについて知ってください<詳細版>」や、  
 その他のご案内をご覧ください。

厚労省 HPV

