

## 令和4年度病害虫発生予報第4号（8月予報）概要表

令和4年7月27日  
埼玉県病害虫防除所

作物名・病害虫名		予報内容	
		発生時期	発生量
<u>1 水稻（5月中旬までの移植）</u>			
(1)	いもち病（穂いもち）		やや少
(2)	紋枯病		並
(3)	斑点米カメムシ類		やや多
<u>2 水稻（5月下旬以降の移植）</u>			
(1)	いもち病（葉いもち）（穂いもち）		やや少
(2)	紋枯病		並
(3)	縞葉枯病		並
(4)	ヒメトビウンカ		やや多
(5)	セジロウンカ		並
(6)	ツマグロヨコバイ		やや少
(7)	斑点米カメムシ類		やや多
(8)	フタオビコヤガ（イネアオムシ）（第4世代幼虫）	早	やや少
(9)	イチモンジセセリ（イネツトムシ）（第2世代幼虫）		並
<u>3 大豆</u>			
(1)	紫斑病		並*
(2)	べと病		やや多
(3)	ハスモンヨトウ		並
(4)	ダイズサヤタマバエ		並*
(5)	シロイチモジマダラメイガ		並
(6)	吸実性カメムシ類		並
<u>4 なし</u>			
(1)	ハダニ類		多
(2)	カメムシ類		やや多
(3)	シンクイムシ類（ナシヒメシンクイ）		並

### 表の見方について

- ・ 予報の発生量は、予報月の平年値（埼玉県の過去10年間の平均）との比較で、「少、やや少、並、やや多、多」の5段階で示しています。
- ※ 過去10年間で予報月に発生が確認されていない病害虫については、「発生が見られない」と予想した場合、予報の発生量を「並\*」と示しています。
- ・ 予報の発生時期は、時期の予想ができる病害虫に限り、予報月の平年値（埼玉県の過去10年間の平均）との比較で、「早、やや早、並、やや遅、遅」の5段階で示しています。

作物名・病害虫名		予報内容	
		発生時期	発生量
<u>5 なす（露地栽培）</u>			
(1)	褐色腐敗病		並
(2)	オオタバコガ		多
(3)	ハダニ類		多
(4)	アザミウマ類		多
<u>6 ねぎ</u>			
(1)	黒斑病		やや少
(2)	軟腐病		並
(3)	ネギアザミウマ		多
<u>7 いちご（苗）</u>			
(1)	炭疽病		やや多
(2)	ハダニ類		多
<u>8 茶</u>			
(1)	炭疽病		やや多
(2)	輪斑病		やや少
(3)	チャハマキ（第3世代幼虫）	やや早	やや少
(4)	チャノコカクモンハマキ（第3世代幼虫）		やや少
(5)	チャノホソガ（第3世代幼虫）		やや多
(6)	チャノミドリヒメヨコバイ		並

— 埼玉県農薬危害防止運動実施中！ —

(令和4年5月1日～8月31日)

表の見方について

- ・ 予報の発生量は、予報月の平年値（埼玉県の過去10年間の平均）との比較で、「少、やや少、並、やや多、多」の5段階で示しています。
- ※ 過去10年間で予報月に発生が確認されていない病害虫については、「発生が見られない」と予想した場合、予報の発生量を「並※」と示しています。
- ・ 予報の発生時期は、時期の予想ができる病害虫に限り、予報月の平年値（埼玉県の過去10年間の平均）との比較で、「早、やや早、並、やや遅、遅」の5段階で示しています。

令和4年度病虫害発生予報第4号（8月予報）

令和4年7月27日  
埼玉県病虫害防除所

1 水稻（5月中旬までの移植）

病虫害名	発生予想 (発生量)	予報の根拠	防除上注意すべき事項
いもち病 (穂いもち)	やや少	○7月中旬の発生量：－ □7月の葉いもちの発生量：やや少（－） □5月1日～7月15日までの感染好適日の出現日数：12日（平年：48.5日）（－） □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並（－）	・上位葉に葉いもちの病斑が多いほど、穂いもちが発生しやすいため、注意深く観察して防除の有無や回数を判断する。 ・「病虫害診断のポイントと防除対策」(参照1)を参考に防除対策を実施する。
紋枯病	並	○7月中旬の発生量：－ □県予察ほ場で発生を確認した（＋） □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並（＋）	・水際部に初期発生を確認した場合は、幼穂形成期～乳熟期までに薬剤による防除を実施する。
斑点米 カメムシ類	やや多	○7月中旬の発生量：やや少 □畦畔・雑草地発生調査結果：1地点平均25.8頭(平年20.2頭)（±） □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並（＋）	・「病虫害診断のポイントと防除対策」(参照1)を参考に防除対策を実施する。
<p>【共通注意事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・早期発見に努め、発生を確認したら速やかに防除を実施する。</li> </ul>			

参照1：病虫害診断のポイントと防除対策

<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/point-h27kai.html>

表の見方について

- ・ 予報の発生量は、予報月の平年値（埼玉県の過去10年間の平均）との比較で、「少、やや少、並、やや多、多」の5段階で示しています。
- ※ 過去10年間で予報月に発生が確認されていない病虫害については、「発生が見られない」と予想した場合、予報の発生量を「並※」と示しています。
- ・ 予報の発生時期は、時期の予想ができる病虫害に限り、予報月の平年値（埼玉県の過去10年間の平均）との比較で、「早、やや早、並、やや遅、遅」の5段階で示しています。
- ・ 予報の根拠の○は現在の発生状況、■は今後の発生時期、□は今後の発生量に影響する要因を示し、（＋）は助長または促進、（－）は抑制、（±）は傾向維持を意味します。

## 2 水稻（5月下旬以降の移植）（1/2）

病虫害名	発生予想 (発生量)	予報の根拠	防除上注意すべき事項
いもち病 (葉いもち) (穂いもち)	やや少	○7月中旬の発生量：やや少 □5月1日～7月15日までの感染好適日の出現日数:12日 (平年：48.5日) (－) □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並 (－)	<ul style="list-style-type: none"> <li>病虫害防除所が発表する「いもち病（葉いもち）感染好適日日数」(参照2)を確認し、好適日が続いた場合は、ほ場をよく見回り早期発見に努める。</li> <li>上位葉に葉いもちの病斑が多いほど、穂いもちが発生しやすいため、注意深く観察して防除の有無や回数を判断する。</li> <li>「病虫害診断のポイントと防除対策」(参照1)を参考に防除対策を実施する。</li> </ul>
紋枯病	並	○7月中旬の発生量：－ □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並 (+)	<ul style="list-style-type: none"> <li>窒素肥料の過剰施用は、過繁茂となり発生を助長するため、適正な追肥を実施する。</li> <li>水際部に初期発生を確認した場合は、幼穂形成期～乳熟期までに薬剤による防除を実施する。</li> </ul>
縞葉枯病	並	○7月中旬の発生量：並 □8月のヒメトビウカとの発生量はやや多と予想 (+) □抵抗性品種の作付割合が高い (－)	<ul style="list-style-type: none"> <li>被害株は感染源となるため、早めに抜き取り処分する。</li> <li>「病虫害診断のポイントと防除対策」(参照1)を参考に防除対策を実施する。</li> </ul>
ヒメトビウカ	やや多	○7月中旬の発生量：やや多 □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並 (+)	<ul style="list-style-type: none"> <li>「病虫害診断のポイントと防除対策」(参照1)を参考に防除対策を実施する。</li> </ul>
セジロウカ	並	○7月中旬の発生量：多 □県予察ほ場の発生量:少 (－) □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並 (+)	<ul style="list-style-type: none"> <li>現在、日本植物防疫協会のウヅカ飛来予測システムがシステム障害により停止しているため、病虫害防除所の「ウヅカ飛来予測」(参照3)の更新も停止している。復旧し次第更新するので、飛来予測日が多い場合はほ場をよく見回り、早期発見に努める。</li> </ul>
ツマグロヨコバイ	やや少	○7月中旬の発生量：散見 □抵抗性品種の作付割合が高い (－) □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並 (+)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ツマグロヨコバイに対して抵抗性を持たない品種(「コシヒカリ」や「キヌヒカリ」など)では多発しやすいので早期発見に努める。</li> </ul>

### 表の見方について

- 予報の発生量は、予報月の平年値(埼玉県の過去10年間の平均)との比較で、「少、やや少、並、やや多、多」の5段階で示しています。
- ※ 過去10年間で予報月に発生が確認されていない病虫害については、「発生が見られない」と予想した場合、予報の発生量を「並※」と示しています。
- 予報の発生時期は、時期の予想ができる病虫害に限り、予報月の平年値(埼玉県の過去10年間の平均)との比較で、「早、やや早、並、やや遅、遅」の5段階で示しています。
- 予報の根拠の○は現在の発生状況、■は今後の発生時期、□は今後の発生量に影響する要因を示し、(+)は助長または促進、(－)は抑制、(±)は傾向維持を意味します。

## 2 水稻（5月下旬以降の移植）(2/2)

病虫害名	発生予想 (発生量)	予報の根拠	防除上注意すべき事項
斑点米 カメムシ類	やや多	○7月中旬の発生量：やや多 □畦畔・雑草地発生調査結果： 1地点平均25.8頭(平年20.2頭)(±) □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(＋)	・本田周辺のイネ科雑草で増殖するため、通年で雑草管理を実施する。 ・出穂期前後2週間の除草作業は、本田への侵入を助長するため実施しない。
フタオビ コヤガ (イネアオムシ) (第4世代幼虫)	発生時期 早  発生量 やや少	○7月中旬の発生量：散見 ■7月21日現在の有効積算温度による第3世代成虫の発蛾最盛日は、7月27日と予測(平年8月3日)(＋) □フェロモントラップによる誘殺数：少(－) □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(＋)	・第4世代幼虫が多発生すると被害が甚大になるため、ほ場での発生状況を観察し、発生が多い場合は薬剤による防除を実施する。 ・「病虫害診断のポイントと防除対策」( <a href="#">参照1</a> )を参考に防除対策を実施する。
イチモンジ セセリ (イネツトムシ) (第2世代幼虫)	並	○7月中旬の発生量：やや多 □県予察ほ場での発生量：やや少(－) □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(＋)	・第2世代幼虫が多発生すると被害が甚大になるため、「病虫害診断のポイントと防除対策」( <a href="#">参照1</a> )を参考にほ場での発生状況を観察する。 ・有効積算温度による第2世代幼虫孵化最盛期は7月22日と見られるため、防除適期は7月26日～8月1日である。既に防除適期であるため、発生ほ場では速やかに薬剤による防除を実施する。
【共通注意事項】 ・早期発見に努め、発生を確認したら速やかに防除を実施する(縞葉枯病はヒメトビウンカ対象)。			

参照1：病虫害診断のポイントと防除対策

<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/point-h27kai.html>

参照2：いもち病(葉いもち)感染好適条件出現状況

[https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/data\\_blastam.html](https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/data_blastam.html)

参照3：気象予測データによるウンカ飛来予測状況(トビイロウンカ、セジロウンカ)

[https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/data\\_unkahirai.html](https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/data_unkahirai.html)

表の見方について

- ・予報の発生量は、予報月の平年値(埼玉県の過去10年間の平均)との比較で、「少、やや少、並、やや多、多」の5段階で示しています。
- ※ 過去10年間で予報月に発生が確認されていない病虫害については、「発生が見られない」と予想した場合、予報の発生量を「並※」と示しています。
- ・予報の発生時期は、時期の予想ができる病虫害に限り、予報月の平年値(埼玉県の過去10年間の平均)との比較で、「早、やや早、並、やや遅、遅」の5段階で示しています。
- ・予報の根拠の○は現在の発生状況、■は今後の発生時期、□は今後の発生量に影響する要因を示し、(＋)は助長または促進、(－)は抑制、(±)は傾向維持を意味します。

### 3 大豆

病虫害名	発生予想 (発生量)	予報の根拠	防除上注意すべき事項
紫斑病	並※ (収穫時)	○7月中旬の発生量：－ □前年の発生量(収穫子実)：並(±) □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(±)	・開花期の20日後を目安に薬剤による防除を実施する。 ・本病に対して抵抗性が弱い品種および昨年多発したほ場については、適期防除を心がける。
べと病	やや多	○7月中旬の発生量：－ □前年の発生量(収穫子実)：多(+) □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(－)	・在来品種や県奨励品種の「里のほほえみ」は本病感受性のため、早期発見に努める。 ・「病虫害診断のポイントと防除対策」(参照1)を参考に適期防除を行う。
ハスモンヨトウ	並	○7月中旬の発生量：－ □フェロモントラップによる誘殺数：並(±) □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(+)	・防除所発表のフェロモントラップデータ(参照4)及び「病虫害診断のポイントと防除対策」(参照1)を参考に、適期防除を行う。
ダイズサヤタマバエ	並※	○7月中旬の発生量：－ □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(+)	・開花終期～莢伸長期(開花始めから1～2週間後)を目安に防除を実施する。
シロイチモジマダラメイガ	並	○7月中旬の発生量：－ □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(+)	・子実肥大初期～中期(開花始めから2～7週間後)を目安に防除を実施する。
吸実性カメムシ類	並	○7月中旬の発生量：－ □県予察ほ場で発生が確認された(+) □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(+)	・開花20～40日後を目安に防除を実施する。 ・カメムシ類については、「病虫害診断のポイントと防除対策」(参照1)を参考に防除対策を実施する。 ・ミナミアオカメムシについては、「病虫害診断のポイントと防除対策」(参照1)を参考に防除対策を実施する。
【共通注意事項】			
・早期発見に努め、発生を確認したら速やかに防除を実施する。			

参照1：病虫害診断のポイントと防除対策

<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/point-h27kai.html>

参照4：フェロモントラップ等調査データ

<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/pheromonetrapp.html>

表の見方について

- ・予報の発生量は、予報月の平年値(埼玉県の過去10年間の平均)との比較で、「少、やや少、並、やや多、多」の5段階で示しています。
- ※ 過去10年間で予報月に発生が確認されていない病虫害については、「発生が見られない」と予想した場合、予報の発生量を「並※」と示しています。
- ・予報の発生時期は、時期の予想ができる病虫害に限り、予報月の平年値(埼玉県の過去10年間の平均)との比較で、「早、やや早、並、やや遅、遅」の5段階で示しています。
- ・予報の根拠の○は現在の発生状況、■は今後の発生時期、□は今後の発生量に影響する要因を示し、(+)は助長または促進、(－)は抑制、(±)は傾向維持を意味します。

#### 4 なし

病虫害名	発生 予想 (発生量)	予報の根拠	防除上注意すべき事項
ハダニ類	多	○7月中旬の発生量：多 □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並（±）	・高温期は増殖が早いので、こまめに発生状況を確認する。
カメムシ類	やや多	○7月中旬の発生量：散見 □予察灯等による誘殺数：多（+） □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並（±）	・防除所発表のフェロモントラップ等のデータ（ <a href="#">参照4</a> ）を参考に、発生動向に注意して防除を実施する。 ・7月12日に発表した防除情報「なしの果樹カメムシ類について」（ <a href="#">参照5</a> ）を参考に防除を実施する。
シンクイムシ類 (けしきメシクイ)	並	○7月中旬の発生量：散見 □第2世代成虫のフェロモントラップによる誘殺数：並（±） □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並（±）	・防除所発表のフェロモントラップデータ（ <a href="#">参照4</a> ）を参考に、幼虫の発生初期に薬剤散布を行う。
<b>【共通注意事項】</b> ・薬剤防除の際は、耐性菌・抵抗性害虫の発現を避けるため、作用機構が同じ剤の連用を避ける。			

参照4：フェロモントラップ等調査データ

<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/pheromonetrap.html>

参照5：防除情報「なしの果樹カメムシ類について」

<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/info20220712en.html>

#### 表の見方について

- ・予報の発生量は、予報月の平年値（埼玉県の過去10年間の平均）との比較で、「少、やや少、並、やや多、多」の5段階で示しています。
- ※ 過去10年間で予報月に発生が確認されていない病虫害については、「発生が見られない」と予想した場合、予報の発生量を「並※」と示しています。
- ・予報の発生時期は、時期の予想ができる病虫害に限り、予報月の平年値（埼玉県の過去10年間の平均）との比較で、「早、やや早、並、やや遅、遅」の5段階で示しています。
- ・予報の根拠の○は現在の発生状況、■は今後の発生時期、□は今後の発生量に影響する要因を示し、（+）は助長または促進、（-）は抑制、（±）は傾向維持を意味します。

## 5 なす（露地栽培）

病虫害名	発生予想 (発生量)	予報の根拠	防除上注意すべき事項
褐色腐敗病	並	○7月中旬の発生量：多 □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並（－）	・発病果実の早期発見に努め、見つけ次第切り取って園外で処分する。
オオタバコガ	多	○7月中旬の発生量：散見 □フェロモントラップによる誘殺数：多（＋） □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並（±）	・防除所発表のフェロモントラップデータ（ <a href="#">参照4</a> ）を参考に、適期防除を実施する。
ハダニ類	多	○7月中旬の発生量：多 □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並（±）	
アザミウマ類	多	○7月中旬の発生量：多 □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並（±）	
<b>【共通注意事項】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・病虫害の発生が助長されるので、過繁茂とならないように整枝せん定を行う。</li> <li>・薬剤防除の際は、耐性菌・抵抗性害虫の発現を避けるため、作用機構が同じ剤の連用を避ける。</li> </ul>			

参照4：フェロモントラップ等調査データ

<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/pheromonetrapp.html>

## 6 ねぎ

病虫害名	発生予想 (発生量)	予報の根拠	防除上注意すべき事項
黒斑病	やや少	○7月中旬の発生量：やや少 □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並（－）	
軟腐病	並	○7月中旬の発生量：散見 □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並（±）	・多肥栽培では、発生が助長されるので注意する。 ・多雨が予想される場合は、明渠等を設置し地表水の早期排水を行う。
ネギアザミウマ	多	○7月中旬の発生量：多 □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並（±）	・定植時の粒剤等により初期防除を徹底する。
<b>【共通注意事項】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・早期発見に努め、発生を確認したら速やかに薬剤による防除を実施する。</li> <li>・薬剤防除の際は、耐性菌・抵抗性害虫の発現を避けるため、作用機構が同じ剤の連用を避ける。</li> </ul>			

表の見方について

- ・予報の発生量は、予報月の平年値（埼玉県の過去10年間の平均）との比較で、「少、やや少、並、やや多、多」の5段階で示しています。
- ※ 過去10年間で予報月に発生が確認されていない病虫害については、「発生が見られない」と予想した場合、予報の発生量を「並※」と示しています。
- ・予報の発生時期は、時期の予想ができる病虫害に限り、予報月の平年値（埼玉県の過去10年間の平均）との比較で、「早、やや早、並、やや遅、遅」の5段階で示しています。
- ・予報の根拠の○は現在の発生状況、■は今後の発生時期、□は今後の発生量に影響する要因を示し、（＋）は助長または促進、（－）は抑制、（±）は傾向維持を意味します。



## 7 いちご（苗）

病害虫名	発生 予想 (発生量)	予報の根拠	防除上注意すべき事項
炭疽病	やや多	○7月中旬の発生量：やや多 □気象予報：気温は高い（+）	・胞子が飛散しないよう、チューブかん水など水滴の跳ね返りがない方法でかん水する。 ・被害株は抜き取って適切に処分する。
ハダニ類	多	○7月中旬の発生量：多 □気象予報：気温は高い（±）	・高温期は増殖が早いので、こまめに発生状況を確認する。
<b>【共通注意事項】</b> ・早期発見に努め、発生を確認したら速やかに薬剤による防除を実施する。 ・薬剤防除の際は、耐性菌・抵抗性害虫の発現を避けるため、作用機構が同じ剤の連用を避ける。			

### 表の見方について

- ・予報の発生量は、予報月の平年値（埼玉県の過去10年間の平均）との比較で、「少、やや少、並、やや多、多」の5段階で示しています。
- ※ 過去10年間で予報月に発生が確認されていない病害虫については、「発生が見られない」と予想した場合、予報の発生量を「並※」と示しています。
- ・予報の発生時期は、時期の予想ができる病害虫に限り、予報月の平年値（埼玉県の過去10年間の平均）との比較で、「早、やや早、並、やや遅、遅」の5段階で示しています。
- ・予報の根拠の○は現在の発生状況、■は今後の発生時期、□は今後の発生量に影響する要因を示し、（+）は助長または促進、（-）は抑制、（±）は傾向維持を意味します。

8 茶

病虫害名	発生予想 (発生量)	予報の根拠	防除上注意すべき事項
炭疽病	やや多	○7月中旬の発生量：並 □県予察ほ場の発生量：やや多(+) □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(±)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・降雨日が多い時は感染しやすくなるので、発生傾向に注意する。</li> <li>・耐性菌発現を避けるため、作用機構の同じ剤の連用を避ける。</li> </ul>
輪斑病	やや少	○7月中旬の発生量：やや少 □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(±)	
チャハマキ (第3世代幼虫)	発生時期 やや早  発生量 やや少	○7月中旬の発生量：やや少 ■予察灯調査第2世代成虫初飛来日：7月23日(平年より2.7日早い)(+) □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(±)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ほ場での発生状況を確認し、防除所発表のフェロモントラップデータ(参照4)を参考に若齢幼虫をねらって防除対策を実施する。</li> </ul>
チャノコカク モンハマキ (第3世代幼虫)	やや少	○7月中旬の発生量：やや少 □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(±)	
チャノホソガ (第3世代幼虫)	やや多	○7月中旬の発生量：並 □県予察ほ場の発生量：多(+) □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(±)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ほ場での三角葉巻の発生状況をよく確認する。</li> <li>・防除所発表のフェロモントラップデータ(参照4)を参考に、三角葉巻が目立つ前に早めに薬剤による防除対策を実施する。</li> </ul>
チャノミドリ ヒメヨコバイ	並	○7月中旬の発生量：並 □気象予報：気温は高い、降水量はほぼ平年並(±)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「病虫害診断のポイントと防除対策」(参照1)を参考に防除対策を実施する。</li> <li>・周辺雑草で繁殖するので除草を励行する。</li> </ul>

参照1：病虫害診断のポイントと防除対策

<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/point-h27kai.html>

参照4：フェロモントラップ等調査データ

<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/pheromonetrapp.html>

表の見方について

- ・予報の発生量は、予報月の平年値(埼玉県の過去10年間の平均)との比較で、「少、やや少、並、やや多、多」の5段階で示しています。
- ※ 過去10年間で予報月に発生が確認されていない病虫害については、「発生が見られない」と予想した場合、予報の発生量を「並※」と示しています。
- ・予報の発生時期は、時期の予想ができる病虫害に限り、予報月の平年値(埼玉県の過去10年間の平均)との比較で、「早、やや早、並、やや遅、遅」の5段階で示しています。
- ・予報の根拠の○は現在の発生状況、■は今後の発生時期、□は今後の発生量に影響する要因を示し、(+)は助長または促進、(-)は抑制、(±)は傾向維持を意味します。

(参照 HP)

参照 1：病害虫診断のポイントと防除対策 <https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/point-h27kai.html>

参照 2：いもち病（葉いもち）感染好適条件出現状況

[https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/data\\_blastam.html](https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/data_blastam.html)

参照 3：気象予測データによるウンカ飛来予測状況（トビイロウンカ、セジロウンカ）

[https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/data\\_unkahirai.html](https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/data_unkahirai.html)

参照 4：フェロモントラップ等調査データ

<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/pheromonetrapp.html>

参照 5：防除情報「なしの果樹カメムシ類について」

<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0916/bojo/info20220712en.html>

< 農薬使用上の注意事項 >

- 1 農薬は、ラベルの記載内容を必ず守って使用する。
- 2 剤の使用回数、成分毎の総使用回数、使用量及び希釈倍数は使用の都度、確認する。  
特に、蚕や魚に対して影響の強い農薬など、使用上注意を要する薬剤を用いる場合は、  
周辺への危被害防止対策に万全を期すること。
- 3 農薬を散布するときは、農薬が周辺に飛散しないよう注意する。
- 4 スピードスプレーヤを使用した防除ではドリフトが発生しやすいので、風のない日に適正  
な方法で散布する。
- 5 周辺の住民に配慮し、農薬使用の前に周知徹底する。
- 6 農薬の最新情報は、農薬登録情報提供システム（農林水産省）から検索できます。  
農薬登録情報提供システム（農林水産省） <https://pesticide.maff.go.jp/>

— 埼玉県農薬危害防止運動実施中！ —  
(令和4年5月1日～8月31日)

2 気象概要 1 か月予報 (令和4年7月21日発表)

出典：気象庁ホームページ ([https://www.jma.go.jp/longfcst/103\\_00.html](https://www.jma.go.jp/longfcst/103_00.html))

<予報のポイント>


・暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は高いでしょう。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>

【気 温】 関東甲信地方	20	30	50
【降 水 量】 関東甲信地方	40	30	30
【日照時間】 関東甲信地方	30	30	40

凡例： ■ 低い (少ない) ■ 平年並 ■ 高い (多い)


(参考資料1) 1 か月予報による気温の見通し (地点ごと)



図の見方

- 今年の実況(黒色の太い実線)** —————  
7日間の平均気温(プロットする日からみて3日前から3日後までの7日間の平均気温)を示しています。
- 予想(太い実線と網かけ)** —————  
予想の気温は、週別の平均的な気温の見込みを太線で表しています。また、信頼の程度が40%の幅を濃い網掛けで、70%の幅を薄い網掛けで示しています。>>> [詳細](#)
- 平年値(緑色の太い実線)** —————  
平年値(1981~2010年の30年間の平均)を緑色の太い実線で示しています。
- 昨年の実況(紫色の点線)** - - - - -  
昨年の実況値(7日間平均気温)を紫の点線で示しています。

(参考資料2) 過去の降水量、日照時間、平均気温



☆手洗いでウイルス対策！！☆

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、  
農作業開始前後には、手洗い、手指の消毒を徹底しましょう。

<http://www.pref.saitama.lg.jp/a0907/nouann/tearaiurusutaisaku.html>

問い合わせ先  
埼玉県病虫害防除所  
〒360-0102 埼玉県熊谷市須賀広 784  
電話：048-539-0661 FAX：048-539-0663  
E-mail：k3603114@pref.saitama.lg.jp  
<http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0916/>