

17 多系統萎縮症

P7 <診断のカテゴリー>

- Probable MSA : 以下の1あるいは2に3を伴う
- Possible MSA : 以下の1+3+4あるいは2+3+4
- 3. 自律神経障害 (抑制困難な尿失禁、残尿などの排尿力低下、勃起障害を伴う、起立後3分以内に収縮期血圧が30mmHgもしくは拡張期血圧が15mmHg以上下降のうち1つを認める)
- 3. 自律神経症候 (Probableの基準に満たない程度の起立性低血圧や排尿障害、睡眠時喘鳴、睡眠時無呼吸、もしくは勃起不全)

P3

睡眠時障害の有無	<input type="checkbox"/> 1. あり <input type="checkbox"/> 2. なし	
	ありの場合	<input type="checkbox"/> 1. 睡眠時喘鳴 <input type="checkbox"/> 2. 睡眠時無呼吸 <input type="checkbox"/> 3. REM 睡眠行動異常 (RBD)

自律神経症候は「Probable」または「Possible」の必須項目であり、列記されている所見に1つ以上該当する必要があります。
 「頻尿」や「頑固な便秘」のみでは診断基準を満たさず認定となりません。

P5

自律神経系			
頻尿	<input type="checkbox"/> 1. あり <input type="checkbox"/> 2. なし	尿失禁	<input type="checkbox"/> 1. あり <input type="checkbox"/> 2. なし
排尿障害	<input type="checkbox"/> 1. あり <input type="checkbox"/> 2. なし	頑固な便秘	<input type="checkbox"/> 1. あり <input type="checkbox"/> 2. なし
失神・眼前暗黒感	<input type="checkbox"/> 1. あり <input type="checkbox"/> 2. なし	勃起障害 (男性のみ)	<input type="checkbox"/> 1. あり <input type="checkbox"/> 2. なし
起立性低血圧 (3分以内)	<input type="checkbox"/> 1. あり <input type="checkbox"/> 2. なし		
	臥位	収縮期 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mmHg	拡張期 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mmHg
	立位	収縮期 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mmHg	拡張期 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mmHg
		収縮期 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mmHg	拡張期 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mmHg

起立後3分以内に収縮期「30mmHg」、もしくは拡張期「15mmHg」以上の下降
 → 「Probable」
 上記に満たないが、起立性低血圧がある場合
 → 「Possible」