



急病のときの対応

げり



#7119番で
症状の相談 p.29

げり

3か月未満

- 元気がなく、ぐったりしている。
- 3時間以上、オシッコがでない。
- おう吐がある。
- 38.0℃以上の熱がある。
- くちびるや口の中が乾燥している。
- 血液の混じったウンチがでる。
- 不機嫌が持続する。

3か月～6歳

- 元気がなく、ぐったりしている。
- オシッコがでない、色の濃いオシッコをする。
- ひどくお腹を痛がる。
- よく眠れずに、ウトウトしている。
- 水分をとるのをいやがる。
- 目がくぼんでいる。
- くちびるや口の中が乾燥している。
- 血液の混じったウンチがでる。
- 不機嫌が持続する。

「はい」が1つ以上

1つも「はい」がない

- ・ 休日急患診療所
- ・ 救急医療機関



**お子様の様子を見つ、診療時間になってから
かかりつけの先生に診てもらってください。**
(連休や年末年始のときは、翌日に休日急患
診療所や救急医療機関を受診してください。)

ただし

症状が大きく変わった場合は、休日急患診療所や
救急医療機関を受診してください。

家庭での対処方法

- ① げりがひどいときは、食べ物よりはまず水分を十分に与えましょう。
- ② 家庭内の感染を防ぐために、排泄物の始末をした後に手をよく洗いましょう。

げり